

# Controle de Qualidade Farmacopeico Microquímico e Reações Histoquímicas em Drogas Vegetais (Tratado de Farmacobotânica 2008)

Por Cristiano Ricardo · Publicado em 23/05/2008

Tratado aprofundado de farmacobotânica aplicada à farmácia e microscopia vegetal pelo Prof. Cristiano Ricardo sobre controle de qualidade farmacopeico microquímico e reações histoquímicas em drogas vegetais (Farmacognosia Analítica & Histoquímica Farmacêutica), com anatomia vegetal diagnóstica e diagramas esquemáticos.

Versão online e eventuais atualizações:

<https://cristianoricardo.com/post/controle-de-qualidade-farmacopeico-microquimico-e-reacoes-histoquimicas-em-drogas-vegetais-2008>

---

Farmacognosia Analítica & Histoquímica Farmacêutica · Farmacobotânica & Farmacognosia Diagnóstica

A associação entre a micrografia óptica e reações histoquímicas corantes permite localizar espacialmente compostos de interesse terapêutico e detectar impurezas adulterantes.

## Morfologia Diagnóstica & Esquema Anatômico

Floroglucina Clorídrica (1% + HCl)

Reativo de Weisner para LIGNINA

Coloração Vermelho-Cereja Intensa

Evidencia xilema, fibras esclerenquimáticas e esclereídes

Reativo de Lugol & Sudão III

Lugol (I<sub>2</sub>/KI): Azul/Púrpura com AMIDO

Sudão III: Vermelho-Alaranjado com LIPÍDIOS

Reativo de FeCl<sub>3</sub>: Azul/Verde escuro com TANINOS

## Clarificação de Tecidos com Hidrato de Cloral a 80%

Para viabilizar a microscopia de pós e fragmentos espessos, a amostra é montada em hidrato de cloral a 80% m/v e aquecida levemente. Este reagente dissolve o excesso de grânulos de amido, proteínas celulares e cloroplastos escuros, clarificando os tecidos e tornando cristalinos os estômatos, cristais de oxalato de cálcio e tricomas ocultos.

## As Reações Histoquímicas Oficiais das Farmacopeias

A Floroglucina clorídrica reage com os grupos coniferil e sinapil da lignina originando uma coloração vermelha intensa imediata, delimitando vasos condutores de xilema e células pétreas; o Reativo de Lugol cora a amilose e amilopectina de grânulos de amido em azul e roxo profundo; o Sudão III ou IV cora cutículas cerosas e gotas de óleo em vermelho brilhante; e o Cloreto Férrico identifica taninos por complexação de ferro.

## Determinação de Matérias Estranhas e Teores Limites

As monografias farmacopeicas estabelecem tetos rigorosos de impurezas: porcentagem de cinzas totais e cinzas insolúveis em ácido clorídrico (que quantificam contaminação por sílica terrosa do solo) e presença máxima tolerada de matéria orgânica estranha (caules inertes misturados a folhas nobres).

Prof. Cristiano Ricardo

Farmacêutico-Bioquímico · Especialista em Farmacobotânica, Farmacognosia & Fitoquímica Estrutural · Publicação de 23/05/2008 às 01:45